

СХЕМА ЗАЩИТЫ СЕМЕЧКОВЫХ

А. ЗИМНЯЯ ОБРАБОТКА		
ВРЕМЯ	БОЛЕЗНИ, ВРЕДИТЕЛИ	ПРЕПАРАТЫ
1. Обработка до распускания почек, при температуре больше +5С	Щитовки, ложнощитовки	«30» 500мл/10л
	Парена, молиниоз	«Абига Пик» 60 мл/10л
Б. РАННЕВЕСЕННИЙ ПЕРИОД		
ВРЕМЯ	БОЛЕЗНИ, ВРЕДИТЕЛИ	ПРЕПАРАТЫ
1. Зеленый конус	Листобляшка, тля, парша, медяница, казарка, моль, букарка, боярышница, яблочная моль, плодовая	«БИ-58» – 12мл («ДИ-68», «Рогор», «Дитокс») + «Каратэ Зеон» 3мл («Колфуго супер» и др.)
2. Выдвижение соцветий	Те же + долгоносики, клещи, монилиоз	«Абига Пик» (хлорокись меди, купроксат) 60мл/10л воды + «Фастак» («Альфацин», «Фаскорд», «Аккорд» и др) 3мл/10л воды
3. Розовый бутон	Те же + долгоносики (цветоед) пилильщики, парша, монилиоз, мучнистая роса	«Строби» 1,5-2мл/10л воды или его аналоги
4. Цветение	Те же	«Скор» 2мл/10л воды
5. Конец цветения (75% осыпания лепестков)	Те же	«Абига Пик» (или аналог) 70мл/10л воды + «Фаскорд» (или аналог) 3мл/10л воды
В. ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ – РОСТ ПЛОДОВ		
ВРЕМЯ	БОЛЕЗНИ, ВРЕДИТЕЛИ	ПРЕПАРАТЫ
1. Плод «Лесной орешек» 15-25 мая	Те же вредители и болезни плодоярка	«Инсегар» 6гр/10л воды + «Строби» 2мл/10л воды
2. Плод «Грецкий орех» 25 мая-10 июня	Те же	«Матч» 10гр/10л воды + «Делан» 7гр/10л воды + «Топаз» 3мл/10л воды
3. Рост плодов 10 июня-20 июня	Те же	«Карате Зеон» 4мл/10л воды + «ДИ-68», 15мл/10л воды + «Скор» 2мл/10л воды
4. Рост плодов 21 июня – 1 июля	Те же	«Карборос» («Фуфанон») 15мл/10л воды + «Делан» 7гр/10л воды
Г. С НАЧАЛА ИЮЛЯ ДО НАЧАЛА СЕНТЯБРЯ		
ВРЕМЯ	БОЛЕЗНИ, ВРЕДИТЕЛИ	ПРЕПАРАТЫ
1. Рост плодов 1.07-01.08	Те же вредители и болезни	«Инсегар» 6мл/10л воды + «Скор» 2мл/10л воды + «Топаз» 3мл/10л воды
2. 15.07-01.08	Те же	«Золон» 30мл/10л воды
3. 01.08-15.08	Те же	«Би-58» (или аналоги) 15мл + «Фастак» (или аналог) 3мл + «Делан» 7г/10л воды
4. 15.08. – 01.09.	Те же	«Авант» 4мл/10л воды + «Скор» 2мл/10л воды

- Требуется на рослые деревья 3 – 5 л, молодые 2 – 3 л.

- Полная защита дана в схеме

Из этой схемы обязательны следующие обработки:

1. Зеленый конус;
2. Розовый бутон;
3. Конец цветения;
4. Фаза плодов «Лесной орех»;
5. Фаза плодов « Грецкий орех»;
6. 6-я и 7-я обработки – через 14-20 дней после 5-ой и 6-ой.

СХЕМА ЗАЩИТЫ КОСТОЧКОВЫХ

ВРЕМЯ	БОЛЕЗНИ, ВРЕДИТЕЛИ	ПРЕПАРАТЫ
1. Обработка до распускания почек, при температуре больше +5С	Щитовки, ложнощитовки, молиниоз, клестеспориоз и др.	«30» 500мл/10л
2. Зеленый конус	Вредители, болезни	«Каратэ Зеон» (аналоги) 3 мл/10л воды + «Хорус» 2 мл/10л воды
3. Через 10 – 14 дней	То же	«Карборос» («Фуранон» и др.) 16гр/10л воды + «Делан» 7гр/10л воды
4. Начало бутонизации	То же	«Карате Зеон» (аналоги) 3мл/10л воды + «Скор» 2мл/10л воды
5. Конец цветения	То же	«Золон» 20мл/10л воды + «Хорус» 2,5мл/10л воды
6. Плодообразование	То же	«Фуфанон» («Карбофос» и др) 12мл/10л воды + «Делан» 7гр/10л воды
7. Плодообразование	То же	«Карате Зеон» 3мл/10л воды

- Разрыв во времени между обработками от 10 дней (дождливая погода) и до 15-17 дней (сухая погода)
- Расход жидкости 3-5 л на высокорослые облиственные деревья, 2-3 л на молодые.